

“调”出申城斑斓秋色

霜染万物，秋色正浓。若以气象学而论，上海早已入秋，但若从色彩来讲，上海的秋总是姗姗来迟，让人等得心焦。

作为四季交替最忠实的信使，秋叶总要等冷风的“提醒”，才如同猛然醒来一样纷纷“变装”。从11月到12月，一波又一波的色叶树，开始为上海街头带来层层递进的秋色。再配上街道两旁的老建筑、文化墙、摩天大楼、城市家具，如同油画般厚重、绚丽而有质感，为魔都“调”出明艳斑斓的秋景。

层林尽染

要说上海街头常见的秋色叶树种，银杏、鸡爪槭、无患子、悬铃木、北美枫香、榉树、乌桕、重阳木、娜塔栎、杉树总排得上号。11月上旬，榉树、悬铃木、七叶树等悄悄“变脸”；随后，银杏、鸡爪槭、红枫、乌桕、无患子、枫香等接过“染色”接力棒；待到12月中下旬，随着水杉、池杉和落羽杉由绿转红，赏叶季才画上休止符。

而从色彩来说，炫目的黄、温暖的橙、热烈的红都有着一席之地。例如，素有“活化石”之称的银杏，因生命力顽强、适应上海的自然条件而栽种在很多地方，色叶全盛时总能带来“满地黄金叶”的美景，令人慨叹秋色如许。又如，树姿婆娑优美的鸡爪槭，如果在湿度相对高的环境下，叶片变色会较均匀，叶色也会更纯，成为不少园艺造景师的心头所好。被称为“马褂木”的鹅掌楸就更有意思了，叶片就像一件倒过来的马褂，变色时金黄、橙红、深绿等各种色彩集中在一棵树上，仿佛小马褂们热热闹闹地挂在枝头。

细微“调色”

其实，“季节限定美景”并不仅靠自然的馈赠，更有着人类的努力。如果说，申城加大色叶树种栽量、保留景观道，都是大面积的“调色”，那么，更细微的“调色”也在进行中。

古银杏的“复壮”就是一例。

从2016年开始，在德籍专家樊华教授的指导下，上海开始采用为银杏接种菌根菌的创新复壮技术，陆续在徐汇、闵行、嘉定等区对古银杏的根系接种。通过观察、测试与分析，接种后，不仅古银杏土壤微生物数量显著增加，古银杏根系也明显增多。古树生长越来越健康，秋色中的那一抹金黄也更浓了。

此外，引种时考虑树种适生性，种树时不仅调土还用模块化栽植技术，施有机质、微生物肥料来“改土”，施肥养护、病虫害防治更精心……绿化人的一切努力，都只为秋叶变色更艳丽，挂叶观赏期更长。

赏叶佳地

上海市绿化管理指导站数据显示，2020年，市绿化部门直管的行道树总量约73.7万株，其中落叶景观树种约38.4万株，占比约52%。这几年，随着“五个新城”行道树规划实施推进，以及部分区新、改建道路时推广应用新优树种，落叶景观树种占比已提升至近60%。换句话说，色叶树种得更多了。在此基础上，指导站每年整理出各区秋色景观道路推荐点，今年点位已达177个。

上海市林业总站每年也会发布“郊区红叶地图”，标注色叶树种分布较为集中的路段、公园、片林、生态廊道和苗木基地。比如，去年的红叶地图共158个点位，既有市民熟悉的滨江森林公园、嘉北郊野公园、秋霞圃等公园，也有佘山镇开放休闲林地、目华路防护林、嘉宝片林等小众“打卡点”，方便市民按图索骥。

秋色短暂，且赏且珍惜。



上海常见秋色叶行道树

市绿化管理指导站提供



银杏
银杏科银杏属

<<< 落叶乔木，叶扇形，有长柄，淡绿色，秋季变黄。球花雌雄异株，单性，种子具长梗，下垂，常为椭圆形、长倒卵形、卵圆形或近圆球形。花期3—4月，种子9—10月成熟。树体高大，树干通直，春夏叶色翠绿，深秋金黄。



悬铃木
悬铃木科悬铃木属

<<< 落叶大乔木，树皮光滑，大片块状脱落，叶宽卵形，基部截形或微心形，上部掌状5裂，有时7裂或3裂；球形果序常2个中生。树冠广阔，叶大荫浓，被誉为“行道树之王”。



白蜡
木犀科栉属

<<< 落叶乔木，树皮灰褐色，纵裂。小枝黄褐色，羽状复叶，圆锥花序顶生或腋生枝梢，翅果匙形，花期4—5月，果期7—9月。



榉树
榉科榉属

<<< 落叶乔木，树皮灰白色或褐灰色。单叶互生，叶秋季变色，花期4月，果期9—11月。树姿端庄，高大雄伟，秋叶变成褐红色。



娜塔栎
壳斗科栎属

<<< 落叶乔木，主干直立，大枝平展略有下垂，塔状树冠。秋季叶亮红色或红棕色，每年11月中旬开始变红，至12月末叶变成枯黄色，部分叶片至第二年2月落叶。



鹅掌楸
木兰科鹅掌楸属

<<< 落叶大乔木，中国特有的珍稀植物，高达40米，胸径1米以上，小枝灰色或灰褐色，树干通直光滑。叶马褂状，故有马褂木之称，9—10月叶变黄并开始落叶。花期5月，果期9—10月。

无患子
无患子科无患子属

>>> 落叶大乔木，高可达20余米；小叶5—8对，通常近对生。花序顶生，圆锥形；果橙黄色，干时变黑。花期春季，果期夏秋。树干通直，冠大荫浓，春、夏两季叶色亮绿，秋季叶色明黄。



七叶树
无患子科七叶树属

>>> 落叶乔木。树皮灰褐色，长方片状剥落；冬芽大，具树脂；小叶5—7片，倒卵状长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，叶缘具细锯齿，仅背面脉上疏生柔毛；花序圆锥形，花瓣4，白色；蒴果球形，黄褐色。花期5月，果期9—10月。



北美枫香
金缕梅科枫香树属

>>> 落叶乔木，树干挺直，树冠广展，小枝红褐色，叶互生，掌状5—7裂，春夏叶色暗绿，秋季变红，艳丽醉人。



乌桕
大戟科乌桕属

>>> 落叶大乔木。青年期树干弯曲，成林后树干变直。叶纸质，菱形至卵状菱形，秋色叶红色或橙黄色；总状花序黄绿色；蒴果成熟时黑色，种子外被白色、蜡质的假种皮。



重阳木
大戟科秋枫属

>>> 落叶乔木，高达15米，树冠伞形，三出复叶。花雌雄异株，春季与叶同时开放，花序低垂。果实浆果状，圆球形，成熟时褐红色。花期4—5月，果期10—11月。



鸡爪槭
无患子科槭属

>>> 落叶小乔木，树皮深灰色，树冠伞形。小枝紫或淡紫绿色，老枝淡灰紫色。叶近圆形，基部心形或近心形。因其叶子掌状分裂，形状酷似鸡爪，故名。入秋后转为鲜红色，色艳如花，灿烂如霞。花期5月，果期9—10月。



策划 朱晓昆
文案 金昱矣
手绘 邵晓艳
编辑 钱璐瑶